



# AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

### U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253195 - 3968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

Mail: [servizio.igiene@asl.pe.it](mailto:servizio.igiene@asl.pe.it) – PEC: [igienesanita.aslpe@pec.it](mailto:igienesanita.aslpe@pec.it)

Alla luce dei recenti casi di Morbillo registrati nella ASL di Pescara, al fine di evitare la diffusione della malattia nelle comunità infantili si raccomanda la vaccinazione anti-morbillo, anti-parotite ed anti-rosolia a tutti i soggetti suscettibili (ovvero non immuni). Infatti il morbillo è una malattia virale che, in assenza di vaccinazione, si dimostra altamente contagiosa. L'immunità indotta dal vaccino e quella indotta dalla malattia contratta dura per tutta la vita.

Il morbillo è una malattia esantematica acuta, causata da un virus ad RNA della famiglia dei Paramyxoviridae.

E' altamente infettivo e il contagio avviene tramite secrezioni nasali e faringee e le goccioline respiratorie che si diffondono nell'aria con i colpi di tosse o gli starnuti del malato.

La contagiosità si protrae da quattro giorni prima a quattro giorni dopo la comparsa dell'eruzione cutanea. Il periodo di incubazione della malattia varia da 7 a 18 giorni (in media di 10-12 giorni).

Il 60- 70% di persone con morbillo presenta macchie di Koplik (piccole macchie biancastre in bocca), fastidio alla luce (fotofobia), mal di gola, rinite ed un lieve e generalizzato ingrossamento dei linfonodi. L'esantema fa la sua comparsa tipicamente sul volto e poi si estende su tutto il corpo. E' un'eruzione cutanea di varia forma, di colore rosso vivo.

Il vaccino è efficace se somministrato entro 72 ore dal contatto, ed è infatti indicata l'offerta attiva della vaccinazione ai contatti suscettibili di casi di morbillo entro 72 ore dall'esposizione.

E' raccomandata comunque la Sorveglianza Sanitaria nei contatti stretti di un caso accertato per tutto il periodo dell'incubazione; qualora dovessero insorgere febbre, malessere generale, eruzione cutanea è necessario rivolgersi tempestivamente al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, informandolo del contatto con un precedente caso di morbillo.

Per i contatti di caso di morbillo non vaccinati (ovvero non immuni) che non abbiano sviluppato la malattia, è raccomandata la Vaccinazione trascorso il periodo di Sorveglianza Sanitaria di 18 giorni. Si elencano di seguito le sedi vaccinali con i giorni e gli orari di apertura:

- Pescara (dal Lunedì al Venerdì 8:30 – 12:30, dal Lunedì al Giovedì 14:50 – 16.30)
- Popoli (Giovedì 9:00 – 12:30)
- Scafa (Martedì, Mercoledì e Venerdì 8:45 – 12:45)
- Montesilvano (dal Lunedì al Venerdì 8:30 – 12:30, il Giovedì 15:00 – 17:00)
- Loreto Aprutino (Lunedì – Martedì 9:00 – 12:30)
- Penne (Giovedì e Venerdì 9:00 – 12:00)
- Pianella (Mercoledì 9:00 – 12:30 e 15:00 – 16:30)
- Cepagatti (Martedì – Venerdì 9:00 – 12:30; il Martedì 15:00 -16:30)

#### Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
085/4253356 Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

#### Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535      Città S. Angel085/4253309  
Loreto Aprutino 085/8276710      Montesilvano  
Penne 085/8276515-521      Pianella 085/971376  
Popoli 085/9898404      Scafa 085/9898803